



Numération de larves d'huîtres en Charente Maritime

Prélèvement du 18 juin 2018

PM + 2h = 11h22

Pour
Affichage

Important


Afin d'harmoniser les résultats des numérations de larves avec l'ensemble des sites français, les quantités de larves en Charente Maritime sont maintenant exprimées pour 1,5 m³ au lieu de 15 m³ (il faut diviser par 10 les anciennes références pour comparaison).

1

Bulletin
d'information

	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves pour 1,5 m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	20,3	27,2	6 870	30	0	0
	Les Faulx	19,4	31,4	1 170	60	30	0
Centre	Merignac	18,8	31,2	360	40	0	0
	Les Doux	18,6	32,1	330	30	30	0
Charente	Les Palles	20,4	31,5	660	240	0	0
	La Moulière	19,0	29,5	0	0	0	0
	Fouras	20,9	29,8	330	30	30	0
Moyenne		19,6	30,4	1 389	61	13	0

Évolution de la température de l'eau (-1m)



Température de l'eau :

La température de l'eau est supérieure à la température moyenne de référence* (18,8°C).

* Suivi des larves 1990-2017 par l'Ifremer et le Creaa (Ref. : 28 ans).

Les stades larvaires

Seudre :

- Quantité faible* de larves au stade *petites* sur les Faulx et quantité moyenne sur Coux.
- Quantités faibles* de larves au stade *petites évoluées* sur Coux et les Faulx.
- Quantité faible* de larves au stade *moyennes* sur les Faulx.
- Absence de larves au stade *grosses*.

Centre du Bassin :

- Quantités faibles* de larves aux stades *petites* et *petites évoluées* sur Mérignac et les doux.
- Quantité faible* de larves au stade *moyennes* sur les Doux.
- Absence de larves au stade *grosses*.

Débouché de la Charente :

- Quantités faibles* de larves aux stades *petites* et *petites évoluées* sur les Palles et Fouras.
- Quantités faibles* de larves au stade *moyennes* sur Fouras.
- Absence de larves au stade *grosses*.

*Appréciation des quantités en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 2005-Source CREEA.

Prochain prélèvement de larves d'huîtres le 21 juin 2018

Données disponibles sur notre site Internet : <http://www.creaa.fr/> (Suivi) et sur le site velyger

<https://www.ifremer.fr/velyger/Acces-aux-Donnees>

Répondeur CREEA : 05 46 47 71 21



Numération de larves d'huîtres en Charente Maritime

Prélèvement du 20 juin 2018

PM + 2h = 13h50

Pour Affichage

2

Bulletin d'information

Important

Afin d'harmoniser les résultats des numérations de larves avec l'ensemble des sites français, les quantités de larves en Charente Maritime sont maintenant exprimées pour 1,5 m³ au lieu de 15 m³ (il faut diviser par 10 les anciennes références pour comparaison).

	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves pour 1,5 m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	22,4	24,4	720 ↘	30 ⇨	0	0
	Les Faulx	22,6	26,6	90 ↘	0	0	0
Centre	Merignac	21,5	31,2	330 ↘	0	0	0
	Les Doux	22,5	30,3	240 ↘	0	0	0
Charente	Les Palles	21,5	29,9	90 ↘	0	0	0
	La Moulière	21,5	25,0	0	0	0	0
	Fouras	21,1	32,0	0 ↘	0	0	0
Moyenne		21,9	28,5	210	4	0	0


Les flèches ↘⇨ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

Faible
 Moyenne
 Forte

Évolution de la température de l'eau (-1m)

Les stades larvaires



Température de l'eau :

La température de l'eau est supérieure à la température moyenne de référence* (19,1°C).

* Suivi des larves 1990-2017 par l'Ifremer et le Creaa (Ref. : 28 ans).

Seudre :

- Quantités faibles* de larves au stade *petites* sur Coux et les Faulx.
- Quantité faible* de larves au stade *petites évoluées* sur Coux.
- Absence de larves aux stades *moyennes* et *grosses*.

Centre du Bassin :

- Quantités faibles* de larves au stade *petites* sur Mérignac et les Doux.
- Absence de larves aux stades *petites évoluées*, *moyennes* et *grosses*.

Débouché de la Charente :

- Quantité faible* de larves au stade *petites* sur les Palles.
- Absence de larves aux stades *petites évoluées*, *moyennes* et *grosses*.

*Appréciation des quantités en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 2005- Source CREA.

Prochain prélèvement de larves d'huîtres le 25 juin 2018

Données disponibles sur notre site Internet : <http://www.creaa.fr/> (Suivi) et sur le site velyger

<https://wwwz.ifremer.fr/velyger/Acces-aux-Donnees>

Répondeur CREA : 05 46 47 71 21



Numération de larves d'huîtres en Charente Maritime

Prélèvement du 25 juin 2018

PM + 2h = 18h12

Pour
Affichage

Important

Afin d'harmoniser les résultats des numérations de larves avec l'ensemble des sites français, les quantités de larves en Charente Maritime sont maintenant exprimées pour 1,5 m³ au lieu de 15 m³ (il faut diviser par 10 les anciennes références pour comparaison).

3

Bulletin
d'information

	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves pour 1,5 m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	21,6	29,4	420 ↘	60 ↗	0	0
	Les Faulx	21,9	31,2	0 ↘	0	0	0
Centre	Mérignac	20,2	31,6	120 ↘	120 ↗	0	0
	Les Doux	19,4	32,3	0 ↘	0	0	0
Charente	Les Palles	18,2	34,0	1 320 ↗	30 ↗	0	0
	La Moulière	19,0	33,3	150 ↗	0	60 ↗	30 ↗
	Fouras	20,8	32,9	510 ↗	120 ↗	60 ↗	120 ↗
Moyenne		20,2	32,1	360	47	17	21


Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

Faible
 Moyenne
 Forte

Évolution de la température de l'eau (-1m)

Les stades larvaires



Température de l'eau :

La température de l'eau est supérieure à la température moyenne de référence* (19,5°C).

* Suivi des larves 1990-2017 par l'Ifremer et le Creaa (Ref. : 28 ans).

Seudre :

- Quantités faibles* de larves aux stades *petites* et *petites évoluées* sur Coux.
- Absence de larves aux stades *moyennes* et *grosses*.

Centre du Bassin :

- Quantité faible* de larves au stade *petites* sur Mérignac.
- Quantité moyenne* de larves au stade *petites évoluées* sur Mérignac.
- Absence de larves aux stades *moyennes* et *grosses*.

Débouché de la Charente :

- Quantités faibles* de larves au stade *petites* au débouché de la Charente.
- Quantité faible* de larves au stade *petites évoluées* sur les Palles et quantité moyenne* à Fouras.
- Quantités faibles* de larves au stade *moyenne* sur la Moulière et Fouras.
- Quantité faible* de larves au stade *grosse* sur la Moulière et quantité moyenne* à Fouras.

*Appréciation des quantités en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 2005- Source CREA.

Prochain prélèvement de larves d'huîtres le 28 juin 2018

Données disponibles sur notre site Internet : <http://www.creaa.fr/> (Suivi) et sur le site velyger

<https://www.ifremer.fr/velyger/Acces-aux-Donnees>

Répondeur CREA : 05 46 47 71 21



Numération de larves d'huîtres en Charente Maritime

Prélèvement du 28 juin 2018

PM + 2h = 7h35

Pour
Affichage

Important

Afin d'harmoniser les résultats des numérations de larves avec l'ensemble des sites français, les quantités de larves en Charente Maritime sont maintenant exprimées pour 1,5 m³ au lieu de 15 m³ (il faut diviser par 10 les anciennes références pour comparaison).

4

Bulletin
d'information

	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves pour 1,5 m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	21,8	30,2	360 ↘	0 ↘	0	0
	Les Faulx	20,2	31,8	180 ↗	60 ↗	30 ↗	0
Centre	Mérignac	19,1	32,5	240 ↗	180 ↗	0	0
	Les Doux	18,6	33,0	40 ↗	120 ↗	60 ↗	30 ↗
Charente	Les Palles	17,9	34,0	90 ↘	120 ↗	0	0
	La Moulière	19,1	31,2	0 ↘	0	0 ↘	0 ↘
	Fouras	19,0	33,1	0 ↘	0 ↘	0 ↘	0 ↘
Moyenne		19,4	32,3	130	69	13	4


Les flèches ↗↘↙↘ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

Faible
 Moyenne
 Forte

Évolution de la température de l'eau (-1m)

Les stades larvaires



Température de l'eau :

La température de l'eau est proche de la température moyenne de référence* (19,8°C).

* Suivi des larves 1990-2017 par l'Ifremer et le Creaa (Ref. : 28 ans).

Seudre :

- Quantité faible* de larves au stade *petites sur Coux*.
- Quantités faibles* de larves aux stades *petites, petites évoluées et moyennes sur les Faulx*.
- Absence de larves au stade *grosses*.

Centre du Bassin :

- Quantités faibles* de larves au stade *petites sur Mérignac et les Doux*.
- Quantités moyennes* de larves au stade *petites évoluées sur Mérignac et les Doux*.
- Quantités faibles* de larves aux stades *moyennes et grosses sur les Doux*.

Débouché de la Charente :

- Quantité faible* de larves au stade *petites sur les Palles*.
- Quantité moyenne* de larves au stade *petites évoluées sur les Palles*.
- Absence de larves aux stades *moyennes et grosses*.

*Appréciation des quantités en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 2005- Source CREA.

Prochain prélèvement de larves d'huîtres le 2 juillet 2018

Données disponibles sur notre site Internet : <http://www.creaa.fr/> (Suivi) et sur le site velyger

<https://www.ifremer.fr/velyger/Acces-aux-Donnees>

Répondeur CREA : 05 46 47 71 21